

Juntos

NOS CUIDAMOS MEJOR

¿Cómo seguimos cuidándonos?



NUESTRA PRIORIDAD

Contar con todas las medidas de seguridad para nuestros colaboradores, alumnos y sus familias.

PROTOCOLOS

En constante evolución, mejora y actualización.

APOYO DE EXPERTOS

Nos hemos apoyado en ACHS, Clínica Universidad de los Andes y BMS Technologies. Además de publicaciones MINSAL-MINEDUC.

JUNTOS NOS CUIDAMOS MEJOR


Incorporar conscientemente las medidas de prevención, hacerlas propias y dar nuevas ideas. Contar con el compromiso y colaboración de toda la comunidad escolar.

Elementos de protección personal



MASCARILLA

El uso de mascarilla ya no será obligatorio.
Son los alumnos o sus apoderados quienes decidirán si utilizan o no la mascarilla en el colegio.
Los colegios tendrán mascarillas a disposición para los colaboradores que deseen utilizarla.



PECHERAS Y GUANTES

Para seguridad en las labores de aseo y zona de aislamiento

Lavado frecuente de manos



Todos los lavamanos con jabón, toalla de papel, basurero con tapa y bolsa.



Lavado de manos o uso de alcohol gel cada 2-3 horas.



Dispensadores de alcohol gel al 70%, en todos los recintos cerrados y espacios abiertos.

Protocolo de ingreso



- ✓ Control de temperatura con cámara termográfica.
- ✓ Dispensadores de alcohol gel.
- ✓ Visitas deberán responder las preguntas y entregar carnet de identidad para su registro electrónico.



Ventilación

- ✓ Asegurar ventilación constante de salas de clases, oficinas y todos los espacios cerrados.
- ✓ Se sugiere medición de CO2 en caso de ser necesario.



Acciones frente a un caso sospechoso en el colegio



SÍNTOMAS

Signos o síntomas
1. Fiebre ($\geq 37,8^{\circ}\text{C}$)
2. Pérdida brusca y completa del olfato
3. Pérdida brusca y completa del gusto (ageusia)
4. Tos
5. Congestión nasal
6. Dificultad para respirar (disnea)
7. Aumento de frecuencia respiratoria (taquipnea)
8. Dolor de garganta (odinofagia)
9. Dolor muscular (mialgia)
10. Debilidad general o fatiga
11. Dolor en el pecho (dolor torácico)
12. Calofríos
13. Diarrea
14. Pérdida del apetito (anorexia) o náuseas o vómitos
15. Dolor de cabeza (cefalea)

ZONA AISLAMIENTO

- Atendida por TENS.
- Se contiene y controla signos vitales.
- Derivación a centro de salud para su evaluación.
- Con compromiso de test PCR o test de antígeno y avisar.

CUARENTENA

- **Persona confirmada:** 5 días desde inicio de síntomas o desde toma de muestra (para asintomáticos)
- **Resto del curso:** Continúan en clases ("Personas en alerta Covid") Se sugiere toma de PCR o test de antígeno y estar atentos a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último contacto con estudiante positivo.

Zona de aislamiento



- Para personas que presenten síntomas dentro del colegio, mientras se gestiona su salida.
 - ✓ Zona distinta de la enfermería. Que no sea visible desde afuera, para resguardar la privacidad.
 - ✓ Ventilación natural.
 - ✓ Debe contar con una silla y/o camilla de fácil limpieza.
 - ✓ Mascarillas KN95 disponibles para la persona en aislamiento. TENS debe portar mascarilla quirúrgica o KN95 y mantener una distancia física mayor a 1 metro.
 - ✓ Un basurero con tapa, pedal y doble bolsa para desechar los EPP.
 - ✓ Dispensador de alcohol gel, EPP.
 - ✓ TENS deberá tener un registro de todas las personas que accedan a esta zona, con hora de entrada y salida.
 - ✓ Después de su uso deberá ser ventilada a lo menos por 30 minutos antes de limpiar y desinfectar superficies. Personal de aseo debe utilizar mascarilla y guantes, que deben desecharse al final del procedimiento en una bolsa, con posterior lavado de manos.

Nuevas definiciones

➤ **CASO CONFIRMADO:** Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva o prueba de detección de antígenos para SARSCoV-2 positiva.



➤ **MEDIDAS A TOMAR:**

- ✓ Mantener aislamiento por 5 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su aislamiento 5 días después de la toma de la muestra.
- ✓ Dar aviso inmediato al colegio, el cual deberá informar a las y los apoderados del curso para que estén alerta a la presencia de síntomas de sus hijos. Quienes presenten síntomas, se deben realizar un PCR o un test de antígeno y permanecer en el hogar hasta la entrega de resultados.

➤ **PERSONA EN ALERTA COVID:** Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso correcto de mascarilla, de un caso confirmado desde 2 días antes y hasta 5 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.



➤ **MEDIDAS A TOMAR:**

- ✓ Se recomienda realizar PCR o test de antígenos en un centro de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con el caso.
- ✓ Si no presenta síntomas, continúa asistiendo a clases. Si la persona presenta síntomas, debe realizarse un examen de inmediato y esperar el resultado.
- ✓ Atentos a la aparición de síntomas hasta 5 días desde el último contacto con el caso.

Nuevas definiciones

➤ **CONTACTO ESTRECHO:** Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en caso de confirmarse un brote, y la misma determinará si se cumplen las condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona durante un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado.

➤ **ALERTA DE BROTE:** Se considerará una alerta de brote si en un colegio hay 3 o más casos confirmados en un curso en un lapso de 7 días; o 7 casos o más en el colegio (distintos cursos) en un lapso de 7 días



➤ **MEDIDAS A TOMAR:**

- ✓ La dirección del colegio deberá informar a la respectiva autoridad sanitaria regional, para que la SEREMI de Salud evalúe la situación y pueda establecer las medidas a seguir.
- ✓ Cuando se detecten dos o más casos en docentes, técnicos, administrativos(as) o personal auxiliar del colegio, debe activarse el Protocolo “Trazabilidad de casos confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes o conglomerados”, disponible en <http://epi.minsal.cl/trabajadores-y-trabajadoras-4/>

Medidas de prevención y control



Estado	Descripción	Medidas
A	Estudiante o párvulo sospechoso	<ul style="list-style-type: none">- Aislamiento del estudiante o párvulo.- Realizar test PCR o prueba de detección de antígenos.- Regresa al establecimiento si el resultado es negativo.
B	Estudiante o párvulo confirmado	<ul style="list-style-type: none">- Aislamiento por 5 días.- Resto del curso son personas en alerta de COVID-19, pero continúan con clases presenciales.- Atención al surgimiento de síntomas.- Reforzar medidas de ventilación, evitar aglomeraciones y lavado frecuente de manos.
Alerta de BROTE	3 estudiantes o párvulos de un curso, o 7 estudiantes a nivel del establecimiento confirmados en los últimos 7 días	<ul style="list-style-type: none">- Mismas medidas que en el estado B para los casos confirmados.- La dirección del establecimiento en coordinación con SEREMI de Educación debe avisar a la SEREMI de Salud de esta situación.- La SEREMI de Salud realizará investigación epidemiológica y establecerá medidas en concordancia con la magnitud o gravedad del brote.

Juntos

NOS CUIDAMOS MEJOR